

opis	osivo <b>rajčiny</b>	osivo <b>uhorky</b>	osivo <b>šalát Batavia</b>	osivo <b>redkovky</b>
<b>výsev v interiéri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Február až apríl.</li> <li>• Hĺbka výsevu cca 0,2 cm. Len mierne pokryté substrátom.</li> <li>• Vysievajte na široko.</li> <li>• Zabezpečte dostatočné svetlo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Február až apríl.</li> <li>• Hĺbka výsevu cca 1 - 2 cm.</li> <li>• Vysievajte na široko (cca 4 cm odstup).</li> <li>• Do jednej jamky vložte 4 semienka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Február až august.</li> <li>• Len mierne pokryté substrátom.</li> <li>• Vysievajte na široko.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od polovice marca až do začiatku septembra.</li> <li>• Hĺbka výsevu cca 0,5 - 1 cm. Len mierne pokryté substrátom.</li> </ul>
klíčenie	• Pri cca 20 - 22 °C po 8 - 10 dňoch.	• Pri min. 10 °C po 1 - 2 týždňoch. Optimálne: 24 °C.	• Pri 10 - 16 °C po 6 - 15 dňoch. • Vyššie teploty môžu mať inhibičný účinok na klíčenie.	• Pri 8 - 15 °C po 8 - 10 dňoch.
<b>pikírovanie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keď je viditeľný klíčny list.</li> <li>• Pestujte ďalej pri cca 16 - 20 °C.</li> </ul>	• Keď je viditeľný klíčny list.	• Keď je viditeľný klíčny list.	• Keď je viditeľný klíčny list.
<b>výsadba do záhradného záhonu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od polovice mája.</li> <li>• Rastliny najskôr otužte, chráňte ich pred nočným mrazom.</li> <li>• Rastlina sa umiestni na oporný rám/tyč.</li> <li>• Vzdialenosť rastlín v riadku 50 cm vzdialenosť medzi riadkami 80 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od polovice mája.</li> <li>• Rastliny najskôr otužte, chráňte ich pred nočným mrazom.</li> <li>• Vzdialenosť rastlín v riadku 30 cm vzdialenosť medzi riadkami 100 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od polovice mája.</li> <li>• Nevysádzajte príliš hlboko.</li> <li>• Vzdialenosť rastlín v riadku 30 cm vzdialenosť medzi riadkami 30 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od polovice mája.</li> <li>• Vzdialenosť rastlín v riadku 6 - 8 cm, vzdialenosť medzi riadkami 15 - 20 cm.</li> </ul>
miesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slnčné a teplé, chránené pred vetrom.</li> <li>• Hlboká, kyprá, humusovitá a rovnomerne vlhká pôda.</li> <li>• Rastlina stredne/silne náročná na živiny, pravidelný prísun hnojiva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slnčné až polotienisté, chránené pred vetrom.</li> <li>• Teplá, humusovitá a rovnomerne vlhká pôda.</li> <li>• Dobrý prísun živín a dostatok vody.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ možno slnečné miesto.</li> <li>• Kyprá, humusovitá pôda.</li> <li>• Hnojíť opatrne. Šalát je citlivý na prítomnosť soli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ možno slnečné miesto. Uprostred leta v polotieni.</li> <li>• Kyprá, humusovitá pôda.</li> <li>• Malá potreba hnojiva.</li> </ul>
zber	• Od augusta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cca 80 dní po výseve.</li> <li>• Prvé plody zbierajte skoro, aby rastlina mohla vynaložiť energiu na tvorbu ďalších plodov.</li> </ul>	• Keď sa vyvinie pevná hlávka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 - 8 týždňov po výseve.</li> <li>• Príliš hustý výsev a nedostatok vody spôsobia rýchly rast red'koviek do výšky.</li> </ul>